ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕРБЕРИН

Регистрационный номер: ЛП-№(008219)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Берберин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Берберин

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку:

Активного вещества	
Берберина бисульфата (барбариса алкалоид)	– 5,0 мг
Вспомогательные вещества	– до получения таблетки массой 100 мг
[сахар молочный (лактоза), крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат]	

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, желтого цвета с мелкими, более светлыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей; другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Код АТХ:

A05AX.

Фармакологическое действие

Препарат оказывает желчегонное и спазмолитическое действие, понижает тонус мускулатуры желчного пузыря, уменьшает амплитуду его сокращений, способствует желчеотделению. При приеме Берберина наблюдается увеличение

секреции желчи, уменьшение ее вязкости, нормализуется биохимический состав желчи.

Показания к применению

Хронические заболевания печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гипокинетическому типу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием исследований эффективности и безопасности у данной возрастной группы), непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозно-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

С осторожностью применять при желчнокаменной болезни.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым по 5-10 мг (1-2 таблетки) 3 раза в день, перед едой, запивая водой. Курс лечения – 2-4 недели.

Если в период лечения улучшения на наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Представленные ниже возможные нежелательные реакции распределены по системно-органным классам с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, < 1/10); нечасто (≥1/1000, < 1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); оень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных).

Нарушения со стороны сердца: частота неизвестна: брадикардия.

Нарушения со стороны сосудов: частота неизвестна: снижение апртериального давления.

Нарушения со стороны иммунной истемы: частота неизвестна: аллергические реакции.

Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани: частота неизвестна: повышение тонуса миометрия.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данных о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Данные о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствуют.

Форма выпуска

Таблетки, 5 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.